

二十一、影响健康状态和与保健机构接触的因素(Z00-Z99)

医疗保健服务不仅限于疾病、损伤的诊断和治疗,目前没有生病的人也会接受一定的医疗保健服务,例如免疫接种、体格检查或咨询等。本章为疾病和损伤以外的情况提供了代码。在 ICD-10 中,明确说明本章不能作为国际资料的比较。

(一) 本章的分类范围

主要有下列情况使用本章的编码。

1. 一个人无论生病与否,当他是为了某些特殊原因而寻求健康服务时使用本章的编码。例如:捐献器官或组织、身体健康检查等。
2. 患者的疾病情况已得到解决,但仍存在影响健康的问题时,使用本章的编码。例如:人工造口的维护、放疗、化疗等。
3. 某些类目并非医院患者的情况,是为人口健康普查设立的,因此这些类目在医院中是使用不到的。例如:Z56 与就业和失业有关的问题。
4. 分娩的结局(Z37)与按照出生地点划分活产婴儿(Z38),医院要使用 Z37 类目而且必须使用, Z38 类目作为选择性使用的类目。

(二) 涉及本章编码的查找方法

本章代码(Z00-Z99)的字母索引不是很全面,这是一个非常难索引的章节,因为 Z 代码的内容是描述性词语,而不是医学术语。因此,编码员必须熟悉 Z 代码一章的内容。本章常用的主导词:咨询、检查、观察(对)、供者、管理、状态、接种、个人史等。

(三) 其他有关分类的说明

1. 预防性手术(Z40.-) 患者通常由于有恶性肿瘤家族史、基因突变以及某些疾病的个人病史,入院进行预防性手术。例如:Z40.0 与恶性肿瘤有关的危险因素的预防性手术,包括由于基因突变而预防性切除乳房。此时通常用 Z40.0 作为主要编码,用适当的编码来识别相关的危险因素作为附加编码。
2. 其他矫形外科的随诊医疗(Z47) 是指主要治疗结束后的一些善后治疗。例如:Z47.0 涉及骨折板和其他内固定装置的随诊医疗,患者若已接受过骨折内固定术,本次入院目的是去除内固定器,在没有任何并发症的情况下,Z47.0 为主要诊断,不需要再给予骨折编码。当内固定装置出现移位、断裂时,需要取出内固定装置后重新安装,则要分类于 T84.-。
3. 恢复期(Z54) 手术和操作都可以有恢复期,这是康复过程。但如果恢复期中有治疗,如对造口的维护等,就要强调治疗,恢复期可作为附加编码。
4. 其他手术后状态(Z98) 其他手术后状态是指手术后长期处于某种状态,如关节固定术后。此时,状态编码表示患者存在过去疾病或健康情况的残余问题,其中包括假肢和机械装置的存在。在第二十一章中有一些表达“状态”的编码,例如:Z21 无症状的人类免疫缺陷病毒感染状态、Z33 附带妊娠状态等。状态编码是有意义的,因为“状态”可能会影响治疗及其结果。“状态”编码与“个人史”编码不同,个人史编码表明患者已经没有这种情况。Z89-Z90 和 Z93-Z99 也是在表达患者某种“状态”,只有在没有并发症或设备故障的情况下才使用这些编码。

第二十一章旨在集中那些不属于其他章节的医疗保健相关情况。其中一些编码确定了就诊原因,另一些编码则用于附加编码,提供可能影响患者治疗的有用信息。