



· 指南与共识 ·

妇科恶性肿瘤免疫治疗中国专家共识（2023年版）

中国抗癌协会肿瘤内分泌专业委员会

[摘要] 免疫治疗作为第四大抗肿瘤治疗方法，已在癌症治疗领域取得了突破性进展，其中免疫检查点抑制剂已广泛应用于多种恶性肿瘤的治疗，在妇科恶性肿瘤领域也积累了较多的临床证据和经验。但目前国内外在免疫检查点抑制剂等免疫疗法应用于妇科恶性肿瘤的治疗方面尚缺乏规范。因此，由中国抗癌协会肿瘤内分泌专业委员会牵头，组织多领域专家，以高质量临床研究结果、2023年美国临床肿瘤学会（American Society of Clinical Oncology, ASCO）会议研究结果等为循证医学依据，通过共同讨论及投票，从而形成《妇科恶性肿瘤免疫治疗中国专家共识（2023年版）》。本共识就妇科常见子宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌及其他恶性肿瘤分类推荐了免疫检查点抑制剂单药或联合化疗、靶向治疗等临床应用方案。总结了肿瘤疫苗、过继性细胞免疫治疗和细胞因子等免疫治疗在妇科恶性肿瘤中的相关研究及应用情况，供国内同行参考，以期进一步规范妇科恶性肿瘤免疫治疗的临床实践。

[关键词] 免疫治疗；妇科恶性肿瘤；免疫检查点抑制剂

中图分类号：R737.3 文献标志码：A DOI: 10.19401/j.cnki.1007-3639.2023.10.008

Chinese expert consensus on immunotherapy for gynecological malignant tumors (2023 edition) Society of Onco-Endocrinology of Chinese Anti-Cancer Association

Correspondence to: ZHOU QI, E-mail: Qizhou9128@163.com.

[Abstract] Immunotherapy, as the fourth largest anti-tumor treatment method, has made breakthrough progress in the field of cancer treatment. Checkpoint inhibitors have been widely used in the treatment of various malignant tumors, and a lot of clinical evidence and experience have also been accumulated in the field of gynecological malignant tumors. However, there is still a lack of standardization in the application of immunotherapy such as immune checkpoint inhibitors for the treatment of gynecological malignant tumors. Therefore, led by the Cancer Endocrine Professional Committee of the China Anti-Cancer Association, experts from multiple fields were organized to use high-quality clinical research results as well as the results of the 2023 American Society of Clinical Oncology (ASCO) conference as evidence. Through discussion and voting, the consensus of Chinese experts on immunotherapy for gynecological malignant tumors (2023 version) has been formed. This consensus recommended the clinical application of immune checkpoint inhibitors for the classification of common gynecological cervical cancer, endometrial cancer, ovarian cancer and other malignant tumors, such as single drug or combination chemotherapy, targeted therapy, etc. It summarized the research and application of tumor vaccines, adoptive cell immunotherapy and cytokine immunotherapy in gynecological malignant tumors, and provided reference for domestic peers, in order to further standardize the clinical practice of immunotherapy for gynecological malignant tumors.

[Key words] Immunotherapy; Gynecological malignant tumors; Immune checkpoint inhibitors

近年来，免疫治疗作为第4大抗肿瘤治疗方法，已在癌症治疗领域取得了突破性进展，早在2013年被*Science*杂志评为年度十大科学

突破之首^[1]。目前，妇科肿瘤的免疫治疗主要围绕免疫检查点抑制剂（immune checkpoint inhibitors, ICI）、治疗性疫苗和过继性细胞

基金项目：重庆市科技局技术创新与应用发展专项（cstc2019jcsx-msxmX0106）；重庆英才计划“包干制”项目（基础研究与前沿探索类）（cstc2021ycjh-bgzxm0134）；重庆市医学科技创新四大中心建设项目-重庆市卵巢癌专病医学研究中心项目。

通信作者：周琦（ORCID: 0000-0001-5673-4263），主任医师，教授，E-mail: Qizhou9128@163.com。

免疫治疗 (adoptive cell therapy, ACT) 等。其中, 最为广泛使用和开展研究最多的妇科恶性肿瘤免疫治疗是ICI。ICI通过阻断免疫检查点信号传递, 恢复T细胞功能, 诱导免疫细胞的肿瘤杀伤作用。目前已发现10多种免疫检查点, 其中研究尤为广泛而深入的是程序性死亡 [蛋白] -1 (programmed death-1, PD-1) 及程序性死亡 [蛋白] 配体-1 (programmed death ligand-1, PD-L1) 及细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4 (cytotoxic T lymphocyte-associated antigen-4, CTLA-4)。目前用于预测PD-1/PD-L1免疫疗法的生物标志物众多, 但尚未有统一标准。PD-1/PD-L1抑制剂对于PD-L1表达阳性的肿瘤总体效果较好, PD-1/PD-L1在子宫内膜癌、妊娠滋养细胞肿瘤及宫颈癌组织中表达广泛。由于肿瘤异质性和不同平台检测方法的差异, PD-L1阳性率差异大, 对于临床患者筛选也存在限制。肿瘤突变负荷 (tumor mutation burden, TMB) 由于肿瘤基因突变的局限性及临界值尚不明确, 是否能作为筛选免疫获益指标仍存在争议^[2]。DNA错配修复 (mismatch repair, MMR) 缺陷 (MMR deficient, dMMR) 使DNA复制过程中的修复功能缺失, 出现微卫星不稳定, MMR正常的子宫内膜癌中PD-L1的表达水平明显低于dMMR型子宫内膜癌, MMR状态可以用于预测PD-1/PD-L1抑制剂对肿瘤的治疗效果^[3]。目前进口或国产ICI药物不断被推荐用于妇科恶性肿瘤。然而, 在临床实践中, 如何选择免疫治疗优势人群、确定治疗方案、评估疗效、处理不良反应 (adverse event, AE) 等方面的临床应用尚缺乏专业推荐。因此, 由中国抗癌协会肿瘤内分泌专业委员会牵头, 组织多领域专家, 依据高级别循证医学依据, 通过共同讨论及投票, 形成《妇科恶性肿瘤免疫治疗中国专家共识 (2023年版) 》, 供国内同行参考, 以期进一步规范妇科恶性肿瘤免疫治疗的临床实践。

本共识已在国际实践指南注册与透明化平台 (Practice Guideline Registration for

Transparency, PREPARE) 上注册, 注册号为PREPARE-2023CN373。

1 共识指定方法

本共识以应用于妇科恶性肿瘤免疫治疗为目标, 结合中国的实际情况, 采用国际公认的证据评价与推荐意见分级、制定和评价 (Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation, GRADE) 标准和流程制定, 形成有实际应用价值的共识。本共识形成的主要步骤如下。

1.1 成立共识专家工作组

中国抗癌协会肿瘤内分泌专业委员会组织邀请国内相关领域专家共同组成《妇科恶性肿瘤免疫治疗中国专家共识 (2023年版) 》工作组。工作组所有参与成员均无利益冲突。

1.2 确定共识范畴

本共识就妇科常见宫颈癌、子宫内膜癌、卵巢癌及其他恶性肿瘤分类推荐了ICI单药或联合化疗、靶向治疗等临床应用方案。总结了肿瘤疫苗、过继性细胞免疫治疗和细胞因子等免疫治疗在妇科恶性肿瘤中的相关研究及应用情况。

1.3 系统全面检索相关文献

检索数据库包括外文数据库 (Medline/PubMed Central、EMBASE、Cochrane Library) 和中文数据库 (万方、中国生物医学文献数据库和中国知网)。检索关键词包括: immunotherapy、immunosuppression therapy、immune checkpoint inhibitors、genital diseases、gynecological malignant tumors、恶性肿瘤、免疫治疗、妇科肿瘤。

1.4 证据质量评价

采用目前使用最广泛的证据评价和推荐意见分级系统—GRADE, 它包括两部分: 第一部分为证据评价, 第二部分为推荐意见分级。遵循GRADE系统来评价证据, 考虑证据中的偏倚风险、不一致性、间接性、不精确性和发表偏倚; GRADE系统将证据质量分为高、中、低和极低四个水平。投票意见对共识推荐强度分为强推荐和弱推荐。证据质量分级和共识推荐强度分级见表1。

表1 证据质量分级和共识推荐强度分级

Tab. 1 Evidence quality grading and consensus recommendation grading

证据级别	解释
证据质量分级	
高	未来研究几乎不可能改变现有疗效评价结果的可信度
中	未来研究可能对现有疗效评价有重要影响, 可能改变评价结果可信度
低	未来研究很可能对现有疗效评价有重要影响, 改变评价结果可信度可能性比较大
极低	任何疗效的评价都很不确定
共识推荐强度分级	
强	明确提示干预措施利大于弊或弊大于利
弱	利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当

2 子宫内膜癌免疫治疗临床应用推荐

2.1 ICI单药治疗

2.1.1 帕博利珠单抗

KEYNOTE-158研究^[4]是一项帕博利珠单抗治疗既往治疗失败的微卫星不稳定性-高 (microsatellite instability-high, MSI-H) /dMMR 实体瘤的非随机、开放、II期临床试验, 共入组233例患者, 其中子宫内膜癌患者49例, 完全缓解 (complete response, CR) 为8例, 部分缓解 (partial response, PR) 为20例, 客观缓解率 (objective response rate, ORR) 为57.1%, 中位无进展生存期 (median progression-free survival, mPFS) 为25.7个月, 中位总生存期 (median overall survival, mOS) 未达到。233例患者中, ≥ 3 级治疗相关AE (treatment-related AE, TRAE) 率为15%, ≥ 3 级免疫相关AE (immune-related AE, irAE) 率为6%。根据KEYNOTE-158研究结果, 美国食品药品监督管理局 (Food And Drug Administration, FDA) 加速批准了帕博利珠单抗用于治疗既往接受系统治疗后进展的MSI-H/dMMR的实体瘤。已发表的另一项帕博利珠单抗治疗既往经治的晚期/复发性实体瘤的多队列、开放标签、II期临床研究^[5], 前瞻性评估

生物标志物组织肿瘤突变负荷 (tumor mutation burden, TMB), 纳入的1 073例患者中790例可以进行TMB分析, 102例 (12.9%) 为肿瘤突变负荷高 (tumor mutation burden-high, TMB-H) (≥ 10 个突变/Mb), 688例为非TMB-H。TMB-H的子宫内膜癌患者为15例, 非TMB-H的子宫内膜癌患者为67例。TMB-H的子宫内膜癌ORR为46.7%, 非TMB-H的ORR为6%。105例安全分析数据中, ≥ 3 级TRAE率为15.0%, ≥ 3 级irAE率为9.0%。根据该结果, 美国FDA批准帕博利珠单抗治疗TMB-H、既往治疗后进展的不可切除/转移性实体瘤的适应证。

共识: 推荐帕博利珠单抗用于既往接受系统治疗后进展的TMB-H或MSI-H/dMMR复发性子宫内膜癌治疗。

证据级别: 中

专家共识度: 弱

2.1.2 纳武利尤单抗

NCI-MATCH研究^[6]: 一项纳武利尤单抗单药治疗dMMR的非结直肠癌既往经治过的复发、转移性泛瘤种的II期临床研究中, 纳入42例dMMR的患者, 其中dMMR的子宫内膜癌患者13例, ORR为38.5%, 2例子宫内膜癌患者获得CR。

共识: 纳武利尤单抗用于dMMR/MSI-H子宫内膜癌的二线治疗可选择方案。

证据级别: 中

专家共识度: 弱

2.1.3 多塔利单抗

GARNET研究^[7-8]为一项多塔利单抗 (dorstarlimab) 治疗dMMR、错配修复完整 (mismatch repair proficient, pMMR) 子宫内膜癌的开放标签、单臂、多队列I期临床研究 (NCT02715284), 104例dMMR的既往接受过铂类药物化疗的子宫内膜癌患者被纳入该研究, 71例有可测量的病灶并超过6个月随访纳入疗效

分析, ORR为42.3%, CR为9例(12.7%), PR为21例(29.6%), 疾病控制率(disease control rate, DCR)为57.7%; mPFS为8.1个月, mOS未达到; ≥ 3 级TRAE率为11.5%, ≥ 3 级irAE率为7.7%。pMMR/MSS队列受试者156例, ORR为15.4%, mPFS为2.7个月, mOS为16.9个月。2021年4月, 美国FDA加速批准多塔利单抗用于治疗经铂类药物治疗后进展的dMMR复发或晚期子宫内膜癌。

共识: 多塔利单抗用于dMMR/MSI-H复发性子宫内膜癌的二线及后线治疗其他可选择方案。

证据级别: 中

专家共识度: 弱

2.1.4 阿维鲁单抗

一项阿维鲁单抗治疗dMMR和pMMR复发、转移性子宫内膜癌的II期临床研究^[9]中, 33例患者入组, 31例纳入研究分析(15例dMMR和16例pMMR), pMMR队列由于治疗无效而提前关闭。dMMR队列获得ORR为26.70%(4/15), 1例患者为CR, pMMR队列ORR为6.25%; dMMR队列 vs pMMR队列6个月的PFS率(PFS6)和mPFS分别为: 40.00% vs 6.25%, 4.4个月 vs 1.9个月; mOS为未达到 vs 6.6个月。31例患者中 ≥ 3 级TRAE率为19.40%。

共识: 阿维鲁单抗用于dMMR/MSI-H复发性子宫内膜癌的二线及后线治疗其他可选择方案。

证据级别: 中

专家共识度: 弱

2.2 ICI联合

2.2.1 ICI联合小分子抗血管生成药物

KEYNOTE-775/Study309研究^[10]为一项帕博利珠单抗联合仑伐替尼在子宫内膜癌中的多中心、随机、对照III期临床研究, 纳入827例经标准铂类药物化疗失败的子宫内膜癌患者

(pMMR为697例), 按照1:1分为pembro+lenva对比医师选择的治疗方案(多柔比星或紫杉醇), 主要研究终点为PFS和OS。与化疗相比, pembro+lenva使pMMR患者mPFS延长2.8个月(6.6个月 vs 3.8个月), 疾病复发风险降低40%(HR=0.6); mOS延长5.4个月(17.4个月 vs 1.02个月), 死亡风险降低32%(HR=0.68); 而对于整体人群, mPFS延长3.4个月(7.2个月 vs 3.8个月), 疾病复发风险降低44%(HR=0.56); mOS延长6.9个月(18.3个月 vs 11.4个月), 死亡风险降低38%(HR=0.62); ORR提高17.2%(31.9% vs 14.7%)。帕博利珠单抗联合组和化疗组 ≥ 3 级AE率分别为88.9%和72.7%。

共识: 推荐帕博利珠单抗联合仑伐替尼用于治疗既往接受系统治疗后进展的复发、转移性非MSI-H/dMMR子宫内膜癌。

证据级别: 高

专家共识度: 强

2.2.2 ICI联合化疗

帕博利珠单抗联合标准化疗卡铂/紫杉醇一线治疗晚期/复发性子宫内膜癌的III期临床研究^[11](NRG-GY018, NCT03914612), 纳入816例患者(591例为pMMR、225例为dMMR), 主要终点为pMMR和dMMR人群的PFS。dMMR人群中mPFS, 帕博利珠单抗组未达到, 安慰剂组为7.6个月, 帕博利珠单抗组降低70%的疾病进展或死亡风险(HR=0.30, $P<0.0001$), ≥ 3 级AE率为63.3% vs 47.2%。pMMR人群中mPFS为11.7个月 vs 8.7个月, 帕博利珠单抗组降低43.0%的疾病进展或死亡风险(HR=0.57, $P<0.0001$), ≥ 3 级AE率为55.1% vs 45.3%。dMMR/pMMR人群各个亚组分析均支持帕博利珠单抗+化疗更优。多塔利单抗联合卡铂/紫杉一线治疗晚期子宫内膜癌的安慰剂对照、III期临床研究^[12](RUBY, NCT03981796), 纳入494例受试者随机分成多塔利单抗组和安慰剂组, 主要终点为PFS

[dMMR/MSI-H人群和意向治疗 (intent-to-treat, ITT) 人群] 和OS (ITT人群)。dMMR/MSI-H人群中mPFS: 多塔利单抗组未达到, 安慰剂组为7.7个月, 多塔利单抗组降低72%的疾病进展或死亡风险 (HR=0.28, $P<0.0001$)。全人群中mPFS为11.8个月 vs 7.9个月, 塔利单抗组降低36%的疾病进展或死亡风险 (HR=0.64, $P<0.0001$)。mOS均未达到, ≥ 3 级TRAE率为70.5% vs 59.8% (表2)。

共识: 推荐帕利珠单抗或多塔利珠单抗联合化疗 (紫杉醇和卡铂) 用于晚期、复发性子宫内膜癌患者的一线治疗。

证据级别: 高

专家共识度: 强

2.2.3 ICI联合化疗及多腺苷二磷酸核糖聚合酶 [poly(ADP-ribose) polymerase, PARP] 抑制剂 (PARP inhibitor, PARPi) 治疗

DUO-E研究 (NCT04269200) 是一项三臂、随机、双盲、安慰剂对照、多中心 III 期临床研究, 共入组699例新诊断或复发的 III 期或 IV 期子宫内膜癌患者, 并于2023年5月公布研究结果。这些患者随机接受铂类药物化疗联合imfinzi (度伐利尤单抗) 或安慰剂治疗, 停化疗后, 接受imfinzi+奥拉帕利或单独imfinzi作为维持治疗。结果显示, 在新诊断的晚期或复发子宫内膜癌患者中, 与标准化疗相比, imfinzi联合化疗, 之后使用imfinzi+奥拉帕利或单药imfinzi作为维持治疗, 在无进展生存期方面呈现具有统计学意义的改善。期待后期具体数据公布及改写临床治疗推荐。

表2 ICI在子宫内膜癌中应用推荐总结

Tab. 2 Recommendations for the application of ICI in endometrial cancer

推荐	证据级别	推荐级别	备注
纳武利尤单抗用于复发性子宫内膜癌的二线治疗其他可选择方案	中	弱	dMMR/MSI-H
帕博利珠单抗用于治疗复发性子宫内膜癌	中	弱	MSI-H/dMMR或TMB-H, ≥ 10 个突变/Mb
多塔利单抗用于治疗复发性子宫内膜癌	中	弱	dMMR/MSI-H
阿维鲁单抗用于复发性子宫内膜癌的二线治疗其他可选择方案	中	弱	dMMR/MSI-H
帕博利珠单抗联合仑伐替尼治疗既往系统治疗失败复发性子宫内膜癌患者的一线治疗	高	强	非MSI-H/dMMR
帕博利珠单抗或多塔利珠单抗联合化疗 (紫杉醇和卡铂) 用于晚期、复发性子宫内膜癌患者的一线治疗	高	强	

3 子宫颈癌免疫治疗临床应用推荐

3.1 ICI单药

3.1.1 帕博利珠单抗

KEYNOTE-158研究^[13]为一项单臂、II期帕博利珠单抗单药治疗二线及以上子宫颈癌的临床试验, 共纳入98例子宫颈癌患者, 其中PD-L1阳性患者为82例 (84%), 总体人群的ORR为12.2%, PD-L1阳性的患者为14.6%。总体人群mPFS和mOS分别为2.1和9.4个月, PD-L1阳性的mPFS和mOS分别为2.1和11.0个月, ≥ 3 级TRAE率为12.2%, ≥ 3 级irAE率为5.1%。KEYNOTE-158系列研究^[5]前瞻性检测TMB与帕博利珠单抗治疗效果的关系, 纳入1 073例患者 (子宫颈癌患者75例), 805例检测TMB,

TMB-H (≥ 10 个突变/Mb) 为105例 (13%), TMB-H患者ORR为29%, non-TMB-H患者ORR为6%, ≥ 3 级TRAE率为15%。美国FDA于2018年6月加速批准帕博利珠单抗用于铂类药物化疗后疾病进展的PD-L1阳性 (CPS ≥ 1) 复发或转移性子宫颈癌治疗。2020年, 帕博利珠单抗获批TMB-H (≥ 10 个突变/Mb) 的不可手术/转移性实体瘤适应证。

共识: 推荐帕博利珠单抗用于TMB-H、PD-L1阳性、MSI-H/dMMR复发、转移性子宫颈癌二线及以上治疗。

证据级别: 中

专家共识度: 强

3.1.2 纳武利尤单抗

Checkmate 358研究^[14]为一项纳武利尤单抗治疗复发、转移性宫颈癌、阴道癌、外阴癌的单臂、I/II期临床研究(NCT02488759), 纳入19例宫颈癌患者(10例PD-L1阳性, 6例PD-L1阴性), 总体的ORR为26.3%, mPFS为5.1个月, mOS为21.9个月, ≥ 3 级TRAE率为21.1%。纳武利尤单抗治疗宫颈癌的研究证据有限。

共识: 推荐纳武利尤单抗用于PDL-1阳性既往治疗失败的复发、转移性宫颈癌治疗。

证据级别: 低

专家共识度: 弱

3.1.3 西米普利单抗

EMPOWER-Cervical 1/GOG-3016/ENGOT-cx9研究^[15]为一项西米普利单抗对比研究者选择的化疗单药治疗复发、转移性宫颈癌的随机、对照、双盲、III期临床研究(NCT03257267), 纳入608例患者, 按1:1随机分配到两组, 西米普利单抗 vs 化疗的ORR为16.4%和6.3%, mPFS为2.8个月 vs 2.9个月, mOS为12.5个月 vs 8.5个月, ≥ 3 级TRAE率为45.0% vs 53.4%。在长期生存分析中与研究者选择的化疗相比, 西米普利单抗能显著提高复发、转移性宫颈癌疗效。

共识: 推荐西米普利单抗用于既往治疗失败的复发、转移性宫颈癌治疗。

证据级别: 高

专家共识度: 弱

3.1.4 卡度尼利单抗

一项卡度尼利单抗(PD-1/CTLA-4双特异性抗体)治疗复发、转移性宫颈癌的单臂、多中心、II期临床研究^[16](NCT03852251), 纳入111例既往经过铂类药物化疗失败的复发或转移性宫颈癌患者, 63例(63.6%)患者为PD-L1阳性(PD-L1 CPS ≥ 1)。在可评估疗效的99例患者中, CR率为13.1%, 整体人群ORR为31.3%, mPFS为3.71个月, mOS未达到。PD-L1阳性人群

ORR为41.3%, 在PD-L1阴性的人群中获得16.7%的ORR。在111例受试者中, ≥ 3 级TRAE率为27.9%, ≥ 3 级irAE率为4.5%。卡度尼利单抗(PD-1/CTLA-4双特异性抗体)已获得国家药品监督管理局批准用于既往接受铂类药物治疗失败的复发、转移性宫颈癌(不限PD-L1表达), 卡度尼利单抗也是全球首个肿瘤免疫双特异性抗体, 是国内第一个有宫颈癌适应证的免疫治疗药物。

共识: 推荐卡度尼利单抗用于既往治疗失败的复发、转移性宫颈癌治疗。

证据级别: 中

专家共识度: 强

3.2 免疫联合

3.2.1 ICI联合化疗及抗血管生成药物

3.2.1.1 帕博利珠单抗联合铂类/紫杉醇化疗±贝伐珠单抗

KEYNOTE-826研究^[17]为一项帕博利珠单抗 vs 安慰剂联合铂类药物/紫杉醇化疗±贝伐珠单抗一线治疗晚期、复发、转移性宫颈癌的随机、对照、双盲III期临床研究(NCT03635567), 纳入617例患者, PD-L1 CPS ≥ 1 的患者为548例(89%), PD-L1 CPS ≥ 10 的患者为317例(51%)。免疫联合组对比铂类药物化疗组全人群中的ORR为65.9%和50.8%, PD-L1 CPS ≥ 1 两组的ORR分别为68.1%和50.2%, PD-L1 CPS ≥ 10 两组的ORR分别为69.6%和49.1%。全人群中: 两组的mPFS分别为10.4和8.2个月, 24个月OS率分别为50.4%和40.4%; PD-L1 CPS ≥ 1 的人群中, mPFS为10.4和8.2个月, 24个月OS率分别为53.0%和41.7%; PD-L1 CPS ≥ 10 的人群中, mPFS为10.4和8.1个月, 24个月OS率分别为54.4%和44.6%。 ≥ 3 级任何AE率分别为81.8%和75.1%(表3)。

共识: 帕博利珠单抗联合铂类/紫杉醇±贝伐珠单抗用于PD-L1 CPS ≥ 1 或dMMR或TMB-H的复发、转移性宫颈癌的一线治疗。

证据级别: 高

专家共识度: 强

表3 ICI在子宫颈癌中应用推荐总结

Tab. 3 Recommendations for the application of ICI in cervical cancer

推荐	证据级别	推荐级别	备注
帕博利珠单抗用于复发、转移性子宫颈癌二线及以上治疗	中	强	TMB-H、PD-L1阳性、MSI-H/dMMR
纳武利尤单抗应用于既往治疗失败的复发、转移性子宫颈癌治疗	低	弱	PD-L1阳性
西米普利单抗或卡度尼利单抗应用于既往治疗失败的复发、转移性子宫颈癌治疗	高	弱	
推荐卡度尼利单抗应用于既往治疗失败的复发、转移性子宫颈癌治疗。	中	强	
帕博利珠单抗联合铂类药物/紫杉醇±贝伐珠单抗用于持续性、复发性和转移性子宫颈癌一线治疗	高	强	CPS≥1或dMMR或TMB-H

3.2.1.2 卡度尼利单抗

AK104-210研究^[18]为一项PD-1/CTLA-4双特异性抗体卡度尼利单抗+铂类药物/紫杉醇±贝伐珠单抗一线治疗子宫颈癌的Ⅱ期临床研究(NCT04868708), 纳入45例患者, 分成队列A-15(卡度尼利单抗15 mg/kg)、队列A-10(卡度尼利单抗10 mg/kg)和队列B-10(卡度尼利单抗10 mg/kg+化疗±贝伐珠单抗)的ORR为79.3%, DCR为96.6%(无论PD-L1表达); 针对PD-L1 CPS≥1的人群, ORR为82.4%; 针对PD-L1 CPS<1的人群, ORR为75.0%; mPFS和mOS未达到, ≥3级TRAE率为60%, ≥3级irAE率为15.6%。卡度尼利单抗+铂类药物/紫杉醇±贝伐珠单抗一线治疗子宫颈癌的随机、对照、Ⅲ期临床研究于2022年6月完成入组(440例), 期待结果的公布。暂不推荐卡度尼利单抗联合化疗用于晚期、复发子宫颈癌。其他ICI联合化疗±贝伐珠单抗一线治疗晚期子宫颈癌的研究也在进行中, 阿替利珠单抗vs安慰剂+铂类药物化疗+贝伐珠单抗的随机、对照、双盲Ⅲ期一线治疗复发、转移性子宫颈癌的研究(NCT03556839), 样本量为404例, 预计2023年12月完成。Prolgolimab(BCD-100) vs安慰剂+铂类药物化疗±贝伐珠单抗的随机、对照、Ⅲ期临床研究, 样本量为316例, 预计完成时间2024年12月。

共识: 基于当前有限数据结果, 暂不推荐卡度尼利单抗及其他免疫抑制剂在子宫颈癌中联合应用。

证据级别: 低

专家共识度: 强

3.2.2 ICI联合小分子酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitor, TKI)药物

CLAP研究^[19]为一项卡瑞利珠单抗联合甲磺酸阿帕替尼二线治疗复发、转移性子宫颈癌的单臂、Ⅱ期临床研究, 纳入45例患者, 30例PD-L1阳性, 10例PD-L1阴性, 总体ORR为55.6%, PD-L1阳性的ORR为69%, PD-L1阴性的ORR为50%。总体mPFS为8.8个月, PD-L1阳性的mPFS未达到, PD-L1阴性的mPFS为5.2个月, mOS未到达。≥3级TRAE率为71.1%, ≥3级irAE率为8.8%。信迪利单抗联合安罗替尼二线治疗PD-L1阳性的复发、转移性子宫颈癌的单臂、Ⅱ期临床研究^[20](ChiCTR1900023015), 纳入42例既往至少接受过一次系统性化疗的PD-L1阳性患者, ORR为54.8%, mPFS为9.4个月, mOS为17.4个月, ≥3级TRAE率为16.7%。鉴于上述研究为Ⅱ期小样本临床试验, 相关循证医学依据并不充分, 临床上宜谨慎使用。

共识： 基于当前数据，暂不推荐ICI联合小分子TKI药物在子宫颈癌中联合应用。

证据级别： 低

专家共识度： 强

4 卵巢癌免疫治疗临床应用推荐

4.1 ICI单药

ICI单药治疗复发卵巢癌疗效欠佳，尚无免疫治疗方案获批用于卵巢癌治疗。

4.2 免疫联合

4.2.1 ICI联合化疗

JAVELIN Ovarian 100研究^[21]及IMagyn050/GOG3015/ENGOT-OV39研究^[22]均未获得阳性结果。这两项研究的结果提示现有证据下并不支持在新诊断的卵巢癌患者中使用ICI。

4.2.2 ICI联合PARPi

2023年6月，美国临床肿瘤学会（American Society of Clinical Oncology, ASCO）公布了奥拉帕利一线治疗卵巢癌的Ⅲ期临床DUO-O试验^[23]中期分析结果，DUO-O是一项随机双盲试验，旨在评估度伐利尤单抗联合铂类药物化疗和贝伐珠单抗，随后给予度伐利尤单抗和贝伐珠单抗（伴或不伴奥拉帕尼）维持治疗，在新确诊的无BRCA突变的晚期卵巢癌患者中的疗效和安全性。结果显示，与对照组（化疗+贝伐珠单抗）相比，奥拉帕尼、度伐利尤单抗、化疗和贝伐珠单抗联合疗法能够在统计学与临床上显著改善患者的无进展生存期。表明新诊断的晚期卵巢癌联合免疫治疗、贝伐珠单抗及PARPi可能获得新的突破，有望第一次把ICI联合治疗写入卵巢癌诊治指南。

4.2.3 双ICI联合

CTLA-4/B7和PD-1/PD-L1是两种最具代表性的免疫检查点途径，它们在T细胞活化的不同阶段负性调节T细胞免疫功能。与单独的PD-1抑制剂相比，针对PD-1和CTLA-4的双重检查点抑制已显示出增强的临床前及临床抗肿瘤活性^[24-29]。美国纪念斯隆凯特琳癌症中心的一项随机Ⅱ期临床研究^[30]结果显示，对于持续性或复发性卵巢癌患者，与单药纳武利尤单抗相比，

接受纳武利尤单抗联合CTLA-4抗体伊匹木单抗（ipilimumab）的缓解率更高，mPFS更长（尽管有限），单药纳武利尤单抗和联合组的mPFS分别为2.0和3.9个月，且联合使用的毒性与既往报道的相当。

4.3 ACT

一项采用肿瘤浸润淋巴细胞（tumor infiltrating lymphocyte, TIL）疗法治疗6例铂类药物耐药卵巢癌患者的初步研究^[31]结果显示，4例患者疾病稳定（stable disease, SD）3个月，2例患者SD 5个月，其中5例患者的靶病灶有所减少，进展主要是由于出现新病灶，而靶病灶总体上保持稳定或消退。一项探索6B11-OCIK过继性细胞治疗铂类药物耐药、复发或难治性卵巢癌的初步安全性和潜在疗效的研究^[32]结果显示，3例铂类药物耐药复发或难治性卵巢癌患者中，1例为SD，2例为PR；2例患者出现潜在的药物相关1级和2级虚弱，未观察到其他AE。这些小样本的初步临床研究结果提示ACT治疗卵巢癌的耐受性良好，毒性可控，可行性尚可，具有潜在的临床疗效，但仍需进一步研究确定疗效及获益人群。

4.4 肿瘤疫苗

SOV01是一项评估卵巢癌树突状细胞疫苗DCVAC/OvCa联合一线标准化疗应用于减瘤手术后新诊断上皮性卵巢癌患者的随机、开放、三臂多中心Ⅱ期临床试验^[33]，共纳入99例患者分为3组：A组患者接受DCVAC/OvCa疫苗与化疗（卡铂和紫杉醇）同时治疗，B组患者接受化疗（卡铂和紫杉醇）与DCVAC/OvCa疫苗序贯治疗，C组患者仅接受化疗（卡铂和紫杉醇），结果显示，化疗后序贯使用DCVAC/OvCa疫苗，患者的mOS最长，疗效最好，3组的mPFS分别为18.3、24.3和18.6个月。随后，研究者针对DCVAC/OvCa疫苗与化疗序贯治疗进行了SOV02试验^[34]，共纳入71例患者，39例患者接受DCVAC/OvCa疫苗与化疗序贯治疗，其中32例患者完成了治疗并获得了可观察的数据，另有32例患者仅接受卡铂联合吉西他滨的化疗，结果显示，DCVAC/OvCa组的mPFS为11.3个月，mOS为35.5个月；化疗组的mPFS为10.1个月；mOS为

22.1个月；DCVAC/OvCa组的mPFS及mOS比化疗组分别延长了1.2和13.4个月。DCVAC/OvCa组患者的2年OS率为72.4%；化疗组患者仅为40.9%。肿瘤疫苗具有潜在的临床疗效，但仍需进一步研究确定其疗效。

共识：基于当前数据，尚无免疫治疗有效方案推荐用于卵巢癌治疗。

证据级别：极低

专家共识度：强

5 其他妇科恶性肿瘤免疫治疗

5.1 外阴、阴道癌

ICI在外阴、阴道癌中相关研究较少。KEYNOTE158外阴癌队列共入组101例晚期患者，ORR为10.9%，mPFS为2.1个月，mOS为6.2个月，中位持续缓解时间（median duration of response, mDOR）为20.4个月^[35]。一项评估纳武利尤单抗在HPV阳性的复发、转移性子宫颈癌、外阴癌或阴道癌的临床试验，包括5例外阴或阴道癌，使用纳武单抗240 mg每2周静脉注射，中位随访时间31周。阴道/外阴癌的客观有效率为20.0%（95% CI: 0.5~71.6）^[36]。

共识：推荐帕博利珠单抗用于TMB-H、PDL1阳性或dMMR/MSH-H外阴癌二线或后线可选择治疗；纳武利尤单抗用于HPV相关肿瘤。

证据级别：低

专家共识度：弱

5.2 外阴阴道黑色素瘤

免疫治疗在黑色素瘤的治疗中占有重要地位，免疫治疗联合化疗的有效率明显高于单纯化疗和单纯免疫治疗。生殖道黑色素瘤应用ICI治疗研究有限，往往借鉴皮肤型黑色素瘤治疗经验。纳武利尤单抗和帕博利珠单抗已被美国FDA批准与CTLA-4抑制剂伊匹木单抗联合使用治疗BRAF V600野生型转移性黑色素瘤患者。另外，伊匹木单抗或纳武利尤单抗可用于区域淋巴结转移或>1 mm的微转移的黑色素瘤术后辅助治

疗。首个国产PD-1抑制剂特瑞普利单抗被中国国家药品监督管理局批准用于既往接受全身系统性治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤^[37]。对初诊黑色素瘤患者建议进行C-KIT、BRAF和NRAS基因检测^[38-39]，其检测结果可指导预后预测、分子分型和晚期治疗。外阴/阴道黑色素瘤中BRAF、NRAS基因突变率很低，C-KIT基因突变则更为常见。BRAF突变阳性者可从BRAF抑制剂维莫非尼（vemurafenib）治疗中获益，突变阴性者可选用PD-1抑制剂。

共识：推荐帕博利珠单抗、纳武利尤单抗和（或）伊匹木单抗用于治疗不可切除或转移性外阴/阴道黑色素瘤患者；推荐特瑞普利单抗、普特利单抗用于经全身治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。

证据级别：低

专家共识度：强

5.3 妊娠滋养细胞肿瘤免疫治疗与临床应用

TROPHIMMUN研究^[40]是第一项前瞻性、单臂、多中心的II期临床研究，对单药化疗耐药的GTN患者，每2周静脉注射avelumab治疗，直至人绒毛膜促性腺激素（human chorionic gonadotrophin, hCG）正常，然后巩固3个周期。在纳入的15例患者中，8例（53.3%）在中位9个周期后hCG降至正常，中位随访时间19个月没有复发。CAP 01研究^[41]是用卡瑞利珠单抗联合甲磺酸阿帕替尼治疗复发/耐药妊娠滋养细胞肿瘤的II期单臂临床研究，20例患者的ORR为55%（95% CI: 32~77），其中10例获得CR（50%；95% CI: 27~73），mPFS为9.5个月（95% CI: NR~NR）；mOS尚未达到。其中5例（71%）再接受入组前未能成功的化疗方案仍能达到CR，提示免疫检查点抑制剂联合抗血管生成可能会调节患者的免疫系统，从而改善化疗的敏感性^[41]。探索新的免疫检查点抑制剂以及免疫治疗联合其他治疗，降低化疗的不良反应是滋养细胞肿瘤治疗的新趋势（表4）。

共识：推荐对化疗耐药/复发的妊娠滋养细胞肿瘤患者个体化挽救治疗。推荐对高危耐药/复发的妊娠滋养细胞肿瘤患者，可以选择单药帕博利珠单抗或卡瑞利珠单抗联合甲磺酸阿帕替尼治疗。

证据级别：中

专家共识度：强

6 妇科肿瘤免疫治疗不良反应及管理

近年来，随着免疫治疗在妇科肿瘤中的应用日

益广泛，其相关AE也备受关注。与免疫治疗相关的AE称为irAE。据统计，几乎所有器官系统都可能受到irAE的影响，包括皮肤、消化道、肺、内分泌系统和心血管系统^[42]。尽管大多数irAE表现较轻且具自限性，但仍有一些严重AE不可预测，甚至出现致死性毒性反应。轻度irAE通常采取对症治疗即可，而对于重度irAE，可能需要停止治疗和（或）给予免疫抑制治疗。因此，对于妇科肿瘤中出现irAE的患者应注重全程化管理，临床医师必须熟知irAE及处理流程，以确保用药安全、患者安全。

表4 ICI在妇科其他恶性肿瘤中应用推荐总结

Tab. 4 Recommendations for the application of ICI in other gynecological malignancies

推荐	证据级别	推荐级别	备注
帕博利珠单抗适用于TMB-H、PD-L1阳性或MSI-H/dMMR的晚期或复发、转移性外阴癌的二线或后线治疗	低	弱	
纳武利尤单抗用于HPV相关的晚期或复发、转移性外阴癌	低	弱	
推荐帕博利珠单抗或纳武利尤单抗和（或）伊匹木单抗用于用于治疗不可切除或转移性外阴/阴道黑色素瘤患者	低	强	
推荐特瑞普利单抗、普特利单抗用于经全身治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗	低	强	
推荐对高危耐药/复发的GTN患者，可以选择单药帕博利珠单抗或卡瑞利珠单抗联合甲磺酸阿帕替尼治疗	中	强	

6.1 irAE的发生机制

irAE发生的确切病理生理学机制尚不清楚，目前认为其与机体自身免疫系统功能的改变相关，包括机体免疫系统过度激活、自身免疫耐受打破，或机体对抗原的识别更加敏感而攻击自身组织^[43]。可能相关机制见表5。

表5 irAE发生的可能机制

Tab. 5 The possible mechanism of irAE

机制	靶向/脱靶
通过B细胞扩增现有的自身抗体	靶向
抑制破坏正常组织的T细胞	靶向
T细胞分泌高水平的细胞因子	靶向
抗体与组织的结合及补体的固定	脱靶

6.2 irAE的发生特点

ICI以免疫细胞为靶点，通过增强抗肿瘤免疫反应起效，可带来长期和持续的临床获益，其

irAE以早期表现为主，最主要的毒性集中在与免疫相关的器官上，如胃肠道、皮肤、甲状腺、肝脏。另外免疫治疗耐受性较好，与化疗引起的AE相比，irAE整体发生率较低，其出现时间通常由受累器官系统决定，从早期发生（第1周）至延迟事件（急性肾损伤最长26周），主要发生时间窗为4~12周，而绝大多数时间发生在前2个月。irAE以1~2级为主，3~4级发生率低，大部分呈可逆性，研究显示ICI通常与短暂性irAE相关，其中大部分可在几周内消失，而与免疫治疗有关的内分泌疾病往往是不可逆的，需要长期激素替代治疗^[44]（证据级别：中；推荐级别：弱）。不同ICI的irAE毒性谱和发生率有所差异，同一ICI作用于不同肿瘤产生的毒性谱不同。

6.3 妇科肿瘤患者常见的irAE

在妇科肿瘤临床研究中，应用ICI的安全性与已知其他瘤种中单药及联合用药的安全性基本一致，ICI常见的irAE包括免疫相关胃肠毒性、

免疫相关皮肤毒性、免疫相关内分泌毒性、免疫治疗肝脏相关AE、免疫相关肺毒性（肺炎）、免疫相关心脏毒性（心肌炎）等^[45]（证据级别：高；推荐级别：弱）。卵巢癌相关irAE：PD-L1抑制剂irAE的发生率为16.8%，常见为甲状腺功能减退和皮疹，3级irAE（结肠炎、2型糖尿病、肌炎）率为2.4%，未见4级或5级irAE^[46]（证据级别：高；推荐级别：弱）。子宫内膜癌相关irAE：常见的irAE为甲状腺功能减退、皮疹、腹泻、肌炎等^[9]。子宫颈癌相关irAE：PD-L1抑制剂的G3及以上irAE率为12%~21%，常见为腹泻、结肠炎、皮疹、肝功能异常、关节疼痛等^[47]。

皮肤毒性是最常见的irAE，多为轻-中度，PD-1/PD-L1抑制剂所致的任意级别和严重皮肤毒性发生率分别为17%~40%和<5%，常发生在治疗早期，包括皮疹、瘙痒、白癜风、反应性皮肤毛细血管增生症，甚至严重大疱性皮炎、中毒性表皮坏死松解症等^[48]。胃肠道毒性也是常见irAE，主要表现为腹泻、结肠炎、临床表现为腹泻、腹痛、大便带血或黏液、发热等，此外还可表现为口腔溃疡、肛门病变等。内分泌毒性是另

一种常见irAE，包括甲状腺功能异常（甲状腺功能减退、甲状腺功能亢进、甲状腺炎等）和急性垂体炎（垂体功能低下，包括中枢肾上腺功能减退、性腺功能减退等），其他少见的irAE包括原发肾上腺功能减退、1型糖尿病、高钙血症、甲状旁腺功能减退等。免疫性肺炎亦十分常见，在所有肺炎病例中，72%的患者为1~2级，与甲状腺炎和肝炎等免疫反应不同，大部分免疫相关性肺炎需要激素或免疫抑制剂治疗。

6.4 irAE的全程化管理策略

2018年ASCO联合美国国家综合癌症网络（National Comprehensive Cancer Network, NCCN）共同发布了《免疫治疗相关不良反应管理指南》以指导临床实践，现已更新至2022年第1版^[49]，2019年中国临床肿瘤学会（Chinese Society of Clinical Oncology, CSCO）发布了《CSCO免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南》^[50]。本共识主要参考CSCO毒性指南。irAE的基本处理原则包括预防、检查、评估、治疗和监测。

6.4.1 预防、检查及评估

irAE的预防、检查及评估详见表6。

表6 irAE的检查及评估

Tab. 6 Examine and evaluation for irAE

检查项目	评估内容	证据级别	推荐级别	备注
一般情况	体格检查（包括神经系统检查）；详细询问病史（包括自身免疫病、内分泌疾病、感染性疾病、吸烟史、家族史、妊娠史及既往治疗情况）和合并用药情况；排便习惯	高	弱	
影像学检查	胸、腹（包括盆腔）CT或MRI；必要时脑MRI	高	弱	
一般血液学检查	血常规，生化检查（包括血糖、血脂）；感染性疾病筛查，如乙型肝炎、丙型肝炎、艾滋病等	高	弱	
皮肤、黏膜	皮肤、黏膜检查，尤其是有免疫性皮肤疾病者	高	弱	
甲状腺	甲状腺功能检测，包括促甲状腺激素、甲状腺素等	高	弱	
肾上腺、垂体	肾上腺：早晨8点血浆皮质醇、促肾上腺皮质激素等检测，垂体、甲状腺功能检测	高	弱	
肺	氧饱和度（静息时和活动时），常规胸部影像学检查，如胸部CT、高危患者行肺功能检查	高	弱	
心血管	心肌酶谱、心电图、心脏彩超（射血分数），必要时请心脏专科医师行个体化评估	高	弱	
类风湿/骨骼肌	对有相关病史者进行关节检查、功能评估	高	弱	

6.4.2 irAE的治疗（分级处理原则）
 一线治疗：激素内分泌系统以补充为主；二
 线治疗：合成的其他免疫抑制剂，单抗类靶向治
 疗药物（表7、8）。

表7 irAE的分级及治疗

Tab. 7 Gradation and treatment of irAE

CTCAE分级	患者护理级别	糖皮质激素的使用	其他ICI	免疫治疗及后续应用
G1	无需住院	不推荐	不推荐	继续
G2	无需住院	局部或全身治疗，口服泼尼松或甲泼尼龙0.5~1.0 mg/（kg·d）	不推荐	暂停使用*
G3	住院治疗	全身治疗，口服或使用泼尼松或甲泼尼龙1~2 mg/（kg·d）	激素治疗3~5 d后症状未能缓解患者可考虑在专科医师指导下恢复免疫治疗	停用，基于患者的风险-获益比讨论是否恢复免疫治疗
G4	住院治疗 激素治疗	考虑ICU，全身治疗，静脉使用甲泼尼龙1~2 mg/（kg·d），连续3 d，后逐渐减量至1 mg/（kg·d）	3~5 d后症状未能缓解患者可考虑在专科医师指导下恢复免疫治疗	永久停用

CTCAE：常见不良事件评价标准（Common Terminology Criteria for Adverse Events）；ICU：重症监护病房（intensive care unit）；*：如仅表现为皮肤或内分泌症状，免疫治疗可继续。

表8 irAE治疗原则

Tab. 8 Treatment principles for irAE

条目	推荐原则	证据级别	推荐级别	备注
推荐1	处理基本原则为基线评估、仔细筛查、定期监测是基础，早期识别和及时干预是关键	高	弱	
推荐2	激素治疗仍作为irAE的首选，其他免疫抑制剂作为补充，同时需严格把握激素应用指征及禁忌	高	弱	
推荐3	对于激素预防irAE的发生，因激素的使用对ICI的疗效不确切，故目前指南不推荐在免疫治疗前预防性使用糖皮质激素	高	弱	
推荐4	及时认识和正确处理严重的irAE，多学科协作，内分泌及肿瘤专家共同参与治疗，如严重的剥脱性皮炎、心肝肾损害。选择性使用直接抑制细胞因子和整合的生物制剂，靶向结合单核细胞表面表达的 $\alpha 4\beta 7$ 整联蛋白的药物维多珠单抗、肿瘤坏死因子- α （tumor necrosis factor- α ，TNF- α ）抑制剂英夫利昔单抗、拮抗IL-2受体 α 链的单克隆抗体巴利昔单抗，以及针对自身免疫性疾病的细胞毒性药物（如霉酚酸酯类、甲氨蝶呤、环磷酰胺）	高	弱	

利益冲突声明：所有作者均声明不存在利益冲突；与相关药物企业无利益冲突。

致谢：

我们衷心感谢《重庆医科大学学报》编辑部唐秋姗女士和其他对本共识提供建议和帮助的专家。

【参 考 文 献】

- [1] MCNUTT M. Cancer immunotherapy [J]. Science, 2013, 342(6165): 1417.
- [2] KIM J Y, KRONBICHLER A, EISENHUT M, et al. Tumor mutational burden and efficacy of immune checkpoint inhibitors: a systematic review and meta-analysis [J]. Cancers, 2019, 11(11): 1798.

- [3] SLOAN E A, RING K L, WILLIS B C, et al. PD-L1 expression in mismatch repair-deficient endometrial carcinomas, including lynch syndrome-associated and MLH1 promoter hypermethylated tumors [J]. Am J Surg Pathol, 2017, 41(3): 326-333.
- [4] MARABELLE A, LE D T, ASCIERTO P A, et al. Efficacy of pembrolizumab in patients with noncolorectal high microsatellite instability/mismatch repair-deficient cancer: results from the phase II KEYNOTE-158 study [J]. J Clin Oncol, 2020, 38(1): 1-10.
- [5] MARABELLE A, FAKIH M, LOPEZ J, et al. Association of tumour mutational burden with outcomes in patients with advanced solid tumours treated with pembrolizumab: prospective biomarker analysis of the multicohort, open-label, phase 2 KEYNOTE-158 study [J]. Lancet Oncol, 2020, 21(10): 1353-1365.

- [6] AZAD N S, GRAY R J, OVERMAN M J, et al. Nivolumab is effective in mismatch repair-deficient noncolorectal cancers: results from arm Z1D—a subprotocol of the NCI-MATCH (EAY131) study [J] . J Clin Oncol, 2020, 38(3): 214–222.
- [7] OAKNIN A, TINKER A V, GILBERT L, et al. Clinical activity and safety of the anti-programmed death 1 monoclonal antibody dostarlimab for patients with recurrent or advanced mismatch repair-deficient endometrial cancer: a non-randomized phase 1 clinical trial [J] . JAMA Oncol, 2020, 6(11): 1766–1772.
- [8] OAKNIN A, POTHURI B, GILBERT L, et al. Dostarlimab in advanced/recurrent (AR) mismatch repair deficient/microsatellite instability-high or proficient/stable (dMMR/MSI-H or MMRp/MSS) endometrial cancer (EC): the GARNET study [J] . J Clin Oncol, 2022, 40(16_suppl): 5509.
- [9] KONSTANTINOPOULOS P A, LUO W X, LIU J F, et al. Phase II study of avelumab in patients with mismatch repair deficient and mismatch repair proficient recurrent/persistent endometrial cancer [J] . J Clin Oncol, 2019, 37(30): 2786–2794.
- [10] MAKKER V, COLOMBO N, CASADO HERRÁEZ A, et al. Lenvatinib plus pembrolizumab for advanced endometrial cancer [J] . N Engl J Med, 2022, 386(5): 437–448.
- [11] ESKANDER R N, SILL M W, BEFFA L, et al. Pembrolizumab plus chemotherapy in advanced endometrial cancer [J] . N Engl J Med, 2023, 388(23): 2159–2170.
- [12] MIRZA M R, CHASE D M, SLOMOVITZ B M, et al. Dostarlimab for primary advanced or recurrent endometrial cancer [J] . N Engl J Med, 2023, 388(23): 2145–2158.
- [13] CHUNG H C, ROS W, DELORD J P, et al. Efficacy and safety of pembrolizumab in previously treated advanced cervical cancer: results from the phase II KEYNOTE-158 study [J] . J Clin Oncol, 2019, 37(17): 1470–1478.
- [14] NAUMANN R W, HOLLEBECQUE A, MEYER T, et al. Safety and efficacy of nivolumab monotherapy in recurrent or metastatic cervical, vaginal, or vulvar carcinoma: results from the phase I/II CheckMate 358 trial [J] . J Clin Oncol, 2019, 37(31): 2825–2834.
- [15] TEWARI K S, MONK B J, VERGOTE I, et al. Survival with cemiplimab in recurrent cervical cancer [J] . N Engl J Med, 2022, 386(6): 544–555.
- [16] WU X H, JI J F, LOU H M, et al. Efficacy and safety of cadonilimab, an anti-PD-1/CTLA4 bi-specific antibody, in previously treated recurrent or metastatic (R/M) cervical cancer: a multicenter, open-label, single-arm, phase II trial (075) [J] . Gynecol Oncol, 2022, 166: S47–S48.
- [17] COLOMBO N, DUBOT C, LORUSSO D, et al. Pembrolizumab for persistent, recurrent, or metastatic cervical cancer [J] . N Engl J Med, 2021, 385(20): 1856–1867.
- [18] WANG J, LOU H M, CAI H B, et al. A study of AK104 (an anti-PD-1 and anti-CTLA4 bispecific antibody) combined with standard therapy for the first-line treatment of persistent, recurrent, or metastatic cervical cancer (R/M CC) [J] . J Clin Oncol, 2022, 40(16_suppl): 106.
- [19] LAN C Y, SHEN J X, WANG Y, et al. Camrelizumab plus apatinib in patients with advanced cervical cancer (CLAP): a multicenter, open-label, single-arm, phase II trial [J] . J Clin Oncol, 2020, 38(34): 4095–4106.
- [20] XU Q, WANG J J, SUN Y, et al. Efficacy and safety of sintilimab plus anlotinib for PD-L1-positive recurrent or metastatic cervical cancer: a multicenter, single-arm, prospective phase II trial [J] . J Clin Oncol, 2022, 40(16): 1795–1805.
- [21] MONK B J, COLOMBO N, OZA A M, et al. Chemotherapy with or without avelumab followed by avelumab maintenance versus chemotherapy alone in patients with previously untreated epithelial ovarian cancer (JAVELIN Ovarian 100): an open-label, randomised, phase 3 trial [J] . Lancet Oncol, 2021, 22(9): 1275–1289.
- [22] MOORE K N, BOOKMAN M, SEHOULI J, et al. Atezolizumab, bevacizumab, and chemotherapy for newly diagnosed stage III or IV ovarian cancer: placebo-controlled randomized phase III trial (IMagyn050/GOG 3015/ENGOT-OV39) [J] . J Clin Oncol, 2021, 39(17): 1842–1855.
- [23] HARTER P, TRILLSCH F, OKAMOTO A, et al. Durvalumab with paclitaxel/carboplatin (PC) and bevacizumab (bev), followed by maintenance durvalumab, bev, and olaparib in patients (pts) with newly diagnosed advanced ovarian cancer (AOC) without a tumor *BRCA1/2* mutation (non-*tBRCAm*): results from the randomized, placebo (pbo)-controlled phase III DUO-O trial [J] . J Clin Oncol, 2023, 41(17_suppl): LBA5506.
- [24] CURRAN M A, MONTALVO W, YAGITA H, et al. PD-1 and CTLA-4 combination blockade expands infiltrating T cells and reduces regulatory T and myeloid cells within B16 melanoma tumors [J] . Proc Natl Acad Sci U S A, 2010, 107(9): 4275–4280.
- [25] BOUTROS C, TARHINI A, ROUTIER E, et al. Safety profiles of anti-CTLA-4 and anti-PD-1 antibodies alone and in combination [J] . Nat Rev Clin Oncol, 2016, 13(8): 473–486.
- [26] CHALABI M, FANCHI L F, DIJKSTRA K K, et al. Neoadjuvant immunotherapy leads to pathological responses in MMR-proficient and MMR-deficient early-stage colon cancers [J] . Nat Med, 2020, 26(4): 566–576.
- [27] O'MALLEY D M, NEFFA M, MONK B J, et al. Dual PD-1 and CTLA-4 checkpoint blockade using balstilimab and zalifrelimab combination as second-line treatment for advanced cervical cancer: an open-label phase II study [J] . J Clin Oncol, 2022, 40(7): 762–771.
- [28] RODIG S J, GUSENLEITNER D, JACKSON D G, et al. MHC proteins confer differential sensitivity to CTLA-4 and PD-1 blockade in untreated metastatic melanoma [J] . Sci Transl Med, 2018, 10(450): eaar3342.
- [29] BLANK C U, ROZEMAN E A, FANCHI L F, et al. Neoadjuvant versus adjuvant ipilimumab plus nivolumab in macroscopic stage III melanoma [J] . Nat Med, 2018, 24(11): 1655–1661.
- [30] ZAMARIN D, BURGER R A, SILL M W, et al. Randomized phase II trial of nivolumab versus nivolumab and ipilimumab

- for recurrent or persistent ovarian cancer: an NRG oncology study [J]. *J Clin Oncol*, 2020, 38(16): 1814–1823.
- [31] PEDERSEN M, WESTERGAARD M C W, MILNE K, et al. Adoptive cell therapy with tumor-infiltrating lymphocytes in patients with metastatic ovarian cancer: a pilot study [J]. *Oncoimmunology*, 2018, 7(12): e1502905.
- [32] CHENG H Y, MA R Q, WANG S, et al. Preliminary safety and potential effect of 6B11-OCIK adoptive cell therapy against platinum-resistant recurrent or refractory ovarian cancer [J]. *Front Immunol*, 2021, 12: 707468.
- [33] ROB L, CIBULA D, KNAPP P, et al. Safety and efficacy of dendritic cell-based immunotherapy DCVAC/OvCa added to first-line chemotherapy (carboplatin plus paclitaxel) for epithelial ovarian cancer: a phase 2, open-label, multicenter, randomized trial [J]. *J Immunother Cancer*, 2022, 10(1): e003190.
- [34] CIBULA D, ROB L, MALLMANN P, et al. Dendritic cell-based immunotherapy (DCVAC/OvCa) combined with second-line chemotherapy in platinum-sensitive ovarian cancer (SOV02): a randomized, open-label, phase 2 trial [J]. *Gynecol Oncol*, 2021, 162(3): 652–660.
- [35] SHAPIRA-FROMMER R, MILESHKIN L, MANZYUK L, et al. Efficacy and safety of pembrolizumab for patients with previously treated advanced vulvar squamous cell carcinoma: results from the phase 2 KEYNOTE-158 study [J]. *Gynecol Oncol*, 2022, 166(2): 211–218.
- [36] OAKNIN A, MOORE K N, MEYER T, et al. 520 MO safety and efficacy of nivolumab (NIVO) ± ipilimumab (IPI) in patients (pts) with recurrent/metastatic cervical cancer in checkmate 358 [J]. *Ann Oncol*, 2022, 33(suppl_7): S782.
- [37] WANG H Y, WU X Y, ZHANG X, et al. Prevalence of *NRAS* mutation, PD-L1 expression and amplification, and overall survival analysis in 36 primary vaginal melanomas [J]. *Oncologist*, 2020, 25(2): e291–e301.
- [38] 中国临床肿瘤学会指南工作委员会. 中国临床肿瘤学会 (CSCO) 黑色素瘤诊疗指南-2020 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2020.
Guidelines Working Committee of the Chinese Clinical Oncology Society. Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) guidelines for the diagnosis and treatment of melanoma-2020 [M]. Beijing: People's Health Publishing House, 2020.
- [39] 中国抗癌协会肉瘤专业委员会软组织肉瘤及恶性黑色素瘤学组. 皮肤和肢端恶性黑色素瘤的外科治疗规范中国专家共识1.0 [J]. *中华肿瘤杂志*, 2020, 42(2): 81–93.
The Soft Tissue Sarcoma and Malignant Melanoma Research Group of the Sarcoma Professional Committee of the Chinese Anti-Cancer Association. Surgical treatment standards for malignant melanoma of the skin and extremities: Chinese expert consensus 1.0 [J]. *Chin J Oncol*, 2020, 42 (2): 81–93.
- [40] YOU B, BOLZE P A, LOTZ J P, et al. Avelumab in patients with gestational trophoblastic tumors with resistance to single-agent chemotherapy: cohort A of the TROPHIMMUN phase II trial [J]. *J Clin Oncol*, 2020, 38(27): 3129–3137.
- [41] CHENG H, ZONG L, KONG Y, et al. Camrelizumab plus apatinib in patients with high-risk chemorefractory or relapsed gestational trophoblastic neoplasia (CAP 01): a single-arm, open-label, phase 2 trial [J]. *Lancet Oncol*, 2021, 22(11): 1609–1617.
- [42] CHHABRA N, KENNEDY J. A review of cancer immunotherapy toxicity: immune checkpoint inhibitors [J]. *J Med Toxicol*, 2021, 17(4): 411–424.
- [43] SULLIVAN R J, WEBER J S. Immune-related toxicities of checkpoint inhibitors: mechanisms and mitigation strategies [J]. *Nat Rev Drug Discov*, 2022, 21(7): 495–508.
- [44] SANTOMASSO B D, NASTOUIL L J, ADKINS S, et al. Management of immune-related adverse events in patients treated with chimeric antigen receptor T-cell therapy: ASCO guideline [J]. *J Clin Oncol*, 2021, 39(35): 3978–3992.
- [45] LEE S M, KIM P, YOU J, et al. Role of damage-associated molecular pattern/cell death pathways in vaccine-induced immunity [J]. *Viruses*, 2021, 13(12): 2340.
- [46] DISIS M L, TAYLOR M H, KELLY K, et al. Efficacy and safety of avelumab for patients with recurrent or refractory ovarian cancer: phase 1b results from the JAVELIN solid tumor trial [J]. *JAMA Oncol*, 2019, 5(3): 393–401.
- [47] MINION L E, TEWARI K S. Cervical cancer—state of the science: from angiogenesis blockade to checkpoint inhibition [J]. *Gynecol Oncol*, 2018, 148(3): 609–621.
- [48] PUZANOV I, DIAB A, ABDALLAH K, et al. Managing toxicities associated with immune checkpoint inhibitors: consensus recommendations from the Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) Toxicity Management Working Group [J]. *J Immunother Cancer*, 2017, 5(1): 95.
- [49] SCHNEIDER B J, LACCHETTI C, BOLLIN K. Management of the top 10 most common immune-related adverse events in patients treated with immune checkpoint inhibitor therapy [J]. *JCO Oncol Pract*, 2022, 18(6): 431–444.
- [50] 赵 静, 苏春霞. 《CSCO免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南》解读: 对比NCCN免疫治疗相关毒性管理指南 [J]. *实用肿瘤杂志*, 2020, 35(1): 11–15.
ZHAO J, SU C X. Interpretation of "Toxicity management guidelines for CSCO immunotherapy related toxicity management guidelines [J]. *J Pract Oncol*, 2020, 35(1): 11–15.

(收稿日期: 2023-06-05 修回日期: 2023-09-04)

妇科恶性肿瘤免疫治疗中国专家共识 (2023年版)

中国抗癌协会肿瘤内分泌专业委员会

执笔专家:

周琦 重庆大学附属肿瘤医院
 邹冬玲 重庆大学附属肿瘤医院
 孙阳 福建省肿瘤医院
 王丹波 辽宁省肿瘤医院
 王莉 河南省肿瘤医院
 龙行涛 重庆大学附属肿瘤医院
 向阳 中国医学科学院北京协和医院
 黄裕 重庆大学附属肿瘤医院
 张师前 山东大学齐鲁医院
 王海霞 重庆大学附属肿瘤医院
 李因涛 山东省肿瘤医院
 吴绮楠 重庆医科大学附属大足医院

李因涛 山东省肿瘤医院
 娄阁 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院
 龙行涛 重庆大学附属肿瘤医院
 鞏伟奇 重庆市中医院
 蒲丹岚 渝北区人民医院
 孙阳 福建省肿瘤医院
 孙蓬明 福建医科大学妇幼保健院
 王海霞 重庆大学附属肿瘤医院
 王丹波 辽宁省肿瘤医院
 王树森 中山大学肿瘤防治中心
 王莉 河南省肿瘤医院
 王中京 华中科技大学同济医学院附属武汉市中心医院

通信作者:

周琦 重庆大学附属肿瘤医院

向阳 中国医学科学院北京协和医院

徐书杭 江苏省中西医结合医院

吴绮楠 重庆医科大学附属大足医院

杨梦柳 重庆医科大学附属第二医院

参与撰写和讨论的专家 (按姓名拼音排序):

蔡红兵 武汉大学附属中南医院
 蔡建良 国家应急医学研究中心
 陈兵 陆军军医大学第一附属医院
 陈月梅 重庆大学附属肿瘤医院
 韩睿 昆明医科大学第一附属医院
 黄裕 重庆大学附属肿瘤医院
 蒋娟 重庆大学附属肿瘤医院
 李冲 重庆医科大学附属大足医院

杨雁 华中科技大学同济医学院附属同济医院

于常华 深圳大学总医院

赵健洁 陆军特色医学中心

邹冬玲 重庆大学附属肿瘤医院

张师前 山东大学附属齐鲁医院

周坚红 浙江大学医学院附属妇产科医院

周琦 重庆大学附属肿瘤医院